провет

Москва, ул. Ленинская Слобода 19, БЦ "Омега Плаза"
+7 (495) 106-47-03
info@provet.ru

ИНТЕСТИ-ФЛОРА

Производитель: Kanters SP
Борьба с бактериальными и некротическим энтеритами, стимуляция иммунитета и продуктивности птицы.

Преимущества

- Борьба с диареями без антибиотиков и без периода ожидания.
- Выраженный антибактериальный эффект.
- Усиливает антикокцидийную программу.
- Стимулирует клеточный иммунный ответ, повышает эффективность вакцинаций.
- Улучшает пищеварение и увеличивает продуктивность.

Состав

ИНТЕСТИ-ФЛОРА состоит из натуральных биологически активных компонентов, в том числе хелат меди в высокой концентрации, забуференные органические кислоты и пребиотик - олигосахариды.

Биологические свойства

Комплекс биологически активных веществ оказывает выраженное антибактериальное действие и стимулирующий эффект на иммунную систему птицы.

- ИНТЕСТИ-ФЛОРА воздействует на **иммунитет**:
  - - стимулирует пролиферацию Т-клеток в кишечнике и гетерофилов в периферической крови птицы;
  - - восполняет необходимые вещества для усиления фагоцитарной активности макрофагов;
  - - стимулируют продукцию ключевого фермента (супероксиддисмутазу) для уничтожения различных патогенных микроорганизмов по кислород-зависимому пути.

- **Стимулирует развитие полезной микрофлоры** и ее колонизации кишечника с помощью пребиотика натурального происхождения и комплекса забуференных органических кислот. Это способствует усилению естественной резистентности организма и оздоровлению кишечника птицы.

- Увеличивает продуктивность птицы и снижает конверсию корма. Забуференные органические кислоты способствуют выделению пищеварительных ферментов и желчи, повышая эффективность переваривания белка. Непереваренный белок не поступает в тонкий кишечник. Действие пребиотика оздоравливает кишечник и увеличивает усвояемость корма.

- ИНТЕСТИ-ФЛОРА эффективно борется с диареями и обеспечивает прямое бактерицидное действие на патогенные бактерии не только в тонком, но и в толстом отделе кишечника. Действие обеспечивается хелатной формой меди (глицинат) и забуференными органическими кислотами, которые вследствие диссоциации уничтожают бактериальные патогены.

- ИНТЕСТИ-ФЛОРА эффективно предотвращает некротический энтерит индейки и кур. Это обусловлено 2 механизмами действия. Первый – биологически активные компоненты оказывают прямой бактерицидный эффект на патогенных клостридий. Второй механизм – ИНТЕСТИ-ФЛОРА предотвращает поступление в толстый кишечник непереваренного белка. В итоге, патогенные клостридии не имеют питательных веществ для активного размножения. Это предупреждает развитие болезни.

- ИНТЕСТИ-ФЛОРА оказывает выраженный эффект при профилактике кокцидиоза. Антикокцидийное действие обусловлено несколькими факторами:
    - - воздействием на развитие кокцидий внутри клетки;
    - - путем стимуляции местного иммунитета в кишечнике;
    - - общим оздоровлением кишечника;
    - - усилением жизнеспособности энтероцитов и меньшей подверженности инвазии;
    - - предотвращению повреждений слизистой патогенными клостридиями.

ИНТЕСТИ-ФЛОРА улучшает действие антикокцидийных средств, даже во время формирования резистентности кокцидий, и снижает интенсивность инвазии.

Результаты опытов

Антикокцидийное действие **ИНТЕСТИ-ФЛОРЫ** изучалось в независимом университете Уртрехта и лаборатории по исследованию кормовых добавок “Feed innovation Services” в Нидерландах. Было доказано, что при экспериментальном заражении различными кокцидиями патологоанатомические поражения (выраженные в баллах) в группе с **ИНТЕСТИ-ФЛОРОЙ**, снижаются в 1,5 раза, по сравнению с контролем.

ИНТЕСТИ-ФЛОРА улучшает показатели продуктивности, повышает сохранность и снижает конверсию корма.

- После вакцинации для стимуляции клеточного иммунитета: 3 дня – 250-500 мл/т воды.
- В период диареи или критический для кокцидиоза и/или некротического энтерита период: 500-1000 мл/т воды в течение 5 дней. При необходимости продолжительность курса может быть увеличена.
- Несушки, родители бройлеров, индейка.
- Для замены антибиотиков и стимуляции иммунитета: первые 5-7 дней жизни – 500-1000 мл/т воды.
- После вакцинации для стимуляции клеточного иммунитета: 3 дня – 250-500 мл/т воды.
- В период диареи или критический для кокцидиоза и/или некротического энтерита период: 500-1000 мл/т воды в течение 5 дней. При необходимости продолжительность курса может быть увеличена.
- В период пика яйценоскости – 2 дня в неделю – 500 мл/т воды.

Дозировка

ИНТЕСТИ-ФЛОРУ вводят с водой в дозировке 250-500 мл/т воды в следующих дозировках:

Бройлеры.
Для замены антибиотиков и стимуляции иммунитета: первые 5-7 дней жизни – 500-1000 мл/т воды.

Условия хранения и транспортировки

Хранят в упаковке производителя, в сухом, хорошо вентилируемом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, при температуре от 0°С до 25°С.
Срок хранения – 2 года со дня изготовления.

Упаковка

Пластиковые канистры 10 л.

Производитель

KANTERS S.P., Нидерланды.