



КАНТЕРС АСИД СА/Р

Производитель: Kanterc SP

Жидкая комбинация кальция и фосфора в легко усваиваемой форме с органическими кислотами. Высокое содержание Са и Р в легкоусвояемой форме

Преимущества

- Высокое содержание Са и Р в легкоусвояемой форме.
- Органические кислоты облегчают всасывание кальция и фосфора, улучшают пищеварение.
- Увеличивает продуктивность животных, улучшает качество костяка, борется с сердечно-сосудистыми болезнями и повышает жизнеспособность.

Состав

- Минеральные элементы: легкоусвояемые соединения кальция и фосфора в высокой концентрации.
- Органические кислоты: муравьиная, пропионовая и молочная.

Биологические свойства

Препарат содержит большое количество легкоусвояемого кальция. Основные функции кальция:

- формирование костной ткани, яичной скорлупы;
- участие в процессах свертывания крови;
- наряду с натрием и калием регулирует работу сердечно-сосудистой системы.

Фосфор дополняет действие кальция в остеогенезе, выполняет важные функции в обмене углеводов и жиров, входит в состав пуриновых нуклеотидов.

Комплекс органических кислот, содержащихся в продукте, значительно расширяет спектр его действия и позволяет использовать в качестве жидкого пребиотика.

Органические кислоты, входящие в состав **КАНТЕРС АСИД СА/Р**:

- понижают pH в желудочно-кишечном тракте, создавая благоприятные условия для развития полезной микрофлоры;
 - улучшают процессы пищеварения, стимулируя активность пищеварительных ферментов;
 - подавляют развитие патогенных бактерий в кишечнике;
 - **КАНТЕРС АСИД СА/Р** увеличивает молочную продуктивность свиноматок, улучшает качество костяка взрослых животных, поросят и птицы, повышает жизнеспособность поросят и индейки.
-

Показания

КАНТЕРС АСИД СА/Р рекомендован:

- Для сельскохозяйственной птицы: бройлеров, ремонтного молодняка, племенной птицы, товарных несушек, индейки, гусей и уток при нарушении формирования скелетной системы, при ухудшении качества скорлупы, слабости конечностей, слабости сосудов и сердечной мышцы.
 - Свиноматкам для повышения молочности, предотвращения развития синдрома послеродовой гипогалактии и для укрепления костяка; свиньям на откорме для укрепления скелета и профилактики диарей.
-

Дозировка

Препарат выпускается в жидкой форме и добавляется к питьевой воде в дозе 1 л на 1000 л. Рекомендуемый минимальный курс применения – не менее 5-7 дней подряд.

Дозировка **КАНТЕРС АСИД СА/Р** не зависит от pH воды. ПРИМЕЧАНИЯ: до начала использования препарата рекомендуется очистить систему поения препаратом **АКВА-КЛИН**. При расчете дозы необходимо учитывать суточное потребление воды.

Свиньи

Супоросным свиноматкам для повышения молочности препарат вводят с питьевой водой в течение 3 дней до опороса и 3 дней после опороса в дозе 10 мл на свиноматку в день. Доза может быть изменена в соответствии с физиологическим состоянием свиноматок.

Свиньям на откорме для укрепления скелета и профилактики диарей – 1л на 1000 л. Рекомендуемый минимальный курс применения – не менее 5-7 дней подряд.

Бройлеры

Четвертая неделя выращивания – характеризуется наиболее интенсивным ростом цыплят-бройлеров, что зачастую сопровождается нарушением формирования скелетной системы и проявляется в виде заболеваний конечностей.

КАНТЕРС АСИД СА/Р позволяет успешно профилактировать эти заболевания. Поэтому в течение 4-й недели выращивания рекомендуется его ежедневное использование (6-7 дней подряд).

Эффективно предотвращает проблемы развития костяка у бройлеров в последний период выращивания при следующей схеме применения: в 1-ю неделю жизни цыплятам дается ПРО-МАК в стандартной дозе (2 дня – 1 л/т воды, затем 0,5 л/т воды), во 2-ю неделю жизни – **КАНТЕРС АСИД СА/Р** в дозе 1 л/т воды. **ПРО-МАК** стимулирует общее развитие бройлера и способствует правильному формированию костной и мышечной систем в 1-ю неделю, а **КАНТЕРС АСИД СА/Р** усиливает это действие во 2-ю неделю.

Товарная несушка и взрослая птица родительского стада

Период пика продуктивности сопровождается снижением естественной резистентности организма птицы и нарушением фосфорно-кальциевого обмена, что может проявляться в виде ухудшения качества скорлупы, слабости конечностей и снижения яйценоскости. Ежедневное использование **КАНТЕРС АСИД СА/Р** (курсами по 6 дней с перерывом на 1 день) позволит значительно уменьшить риск возникновения этих проблем, а также предотвратить риск развития желудочно-кишечных заболеваний и повысить естественную резистентность организма.

Индейка

Для профилактики болезней сосудов и сердца, укрепления костяка.
Применяют в дозе 1 л на 1000 л воды курсами по 6 дней с перерывом на 1 день.

Период ожидания

Отсутствует.

Срок годности

2 года.

Условия хранения

Хранят в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от 5 до 25°C.

Упаковка

Пластиковые канистры по 20 кг.

Производитель

KANTERS S.P., Нидерланды.
