Москва, ул. Ленинская Слобода 19, БЦ "Омега Плаза"
+7 (495) 106-47-03
info@provet.ru

САБКОНТРОЛ

Производитель:
Подкислитель для подавления патогенной микрофлоры в кормах

Преимущества

- Богатый состав: 8 органических кислот и солей в высокой концентрации.
- Эффективная борьба с патогенной микрофлорой, плесенью и дрожжами.
- Работает в корме, внутри оборудования и в пищеварительном тракте животного.
- Борется с Clostridium spp., оздоравливает слизистую оболочку кишечника, повышает продуктивность и улучшает конверсию корма.
- Экономически выгоден, имеет низкие нормы ввода.

Состав

Муравьинокислый натрий ≥ 33%, бензойная кислота ≤ 8%, пропионовокислый кальций ≤ 5%, сорбиновая кислота ≤ 1%, маслянокислый натрий ≤ 5%, лимонная кислота ≥ 9%, фумаровая кислота ≥ 7%, наполнитель – бентонитовая глина ≤ 20%.

Биологические свойства

Совместное использование кислот и органических солей в **САБКОНТРОЛ** создает синергический эффект воздействия на патогены, а также активной стимуляции энергетических и биохимических процессов в организме, оптимизируя переваривание кормов и усиливая всасывание питательных компонентов.

Соли органических кислот менее агрессивны и безопасны в работе, имеют низкую летучесть при термообработке, имеют преимущества при прохождении ЖКТ и могут эффективно работать в дистальных отделах кишечника. Наполнитель в **САБКОНТРОЛ** – алюмосиликат со слоистой структурой, обеспечивает плавное и пролонгированное действие препарата, освобождая подкислитель постепенно на протяжении всего ЖКТ.

Антибактериальный комплекс: формиат натрия, сорбиновая и бензойная кислоты, бутират натрия уничтожает в кормах бактерии *Salmonella, E. coli, Campilobacter, Clostridium* и др., предотвращает повторную контаминацию при хранении. В организме животных останавливает рост *Salmonella, E. coli, Campilobacter, Clostridium* и др., подавляет гнилостные процессы в ЖКТ, создает условия для развития полезной микрофлоры.

Фунгицидный комплекс: бензойная кислота, пропионовокислый кальций и сорбиновая кислота, сочетание которых лучше других кислот способно сдерживать рост плесеней, водорослей, дрожжей. Комплекс обладает выраженными консервирующими свойствами.

Физиолого-стимулирующий комплекс: фумаровая кислота, лимонная кислота, бутират натрия регулируют обменные процессы в организме животных, повышают вкусовые свойства корма.

Фумаровая кислота – легкодоступный источник энергии. Особенно эффективна при экстренных ситуациях резкого нарушения (изменения) обмена веществ (при стрессах). Активирует аппетит и переваримость кормов. Стимулирует синтез мышц и костной ткани. Эффективный стабилизатор кишечной микрофлоры, угнетающий рост патогенных форм грибков и грамположительных бактерий. Снижает pH содержимого желудка, способствует улучшению расщепления протеина, улучшает вкусовые качества корма, стимулирует его переваримость и повышает продуктивность.

Лимонная кислота и бутират натрия стимулируют выделение ферментов поджелудочной железой, активизируют пищеварение в тонком кишечнике.

Бутират натрия и пропионат кальция стимулируют рост кишечных ворсинок и способствуют их регенерации, укрепляет барьерную функцию кишечника. Бутират натрия служит основным источником энергии для энтероцитов, создает благоприятные условия для развития ворсинок эпителия, обладает противовоспалительным и антиоксидантным эффектом, улучшает функционирование иммунной системы кишечника.

Показания

· Подавление роста патогенной микрофлоры в кормах, нормализация пищеварения, повышение сохранности и продуктивности.
· Повышение привесов, сохранности, снижение затрат корма на единицу продукции.
· Уничтожение и профилактика заражения бактериями родов *Salmonella, E.coli, Campylobacter, Clostridium* и др. кормов и ЖКТ.
· Полное подавление роста плесневыми грибами *Penicillium, Aspergillus, Fusarium*, дрожжей в корме, в том числе при использовании сырья повышенной влажности.
· Стабилизация состава микрофлоры и восстановление слизистой кишечника.
· Альтернатива антибиотикам для производства экологически чистых кормов для животных.
· Увеличение поедаемости и усвоения кормов.

Дозировка

КРС

• Телята 1-2 месяца – 5 г/гол/сутки.

• Телята 2-4 месяца – 5 г/гол/сутки.

• Телята 4-6 месяца – 5-10 г/гол/сутки.

• Коровы в период сухостоя – 10-20 г/гол/сутки.

• Коровы в период лактации – 10-20 г/гол/сутки.

Свиньи

• Подсосные поросята – 2,5-3,5 кг/т корма.

• Поросята-отъемыши – 2,0-3,0 кг/т корма.

• Поросята на доращивании – 1,5-2,5 кг/т корма.

• Свиньи на откорме – 1,5-2,0 кг/т корма.

• Супоросные свиноматки и хряки-производители – 1,5-3,0 кг/т корма.

Птица

• цыплята-бройлеры – 1,0-1,5 кг/т корма.

• куры-несушки – до 1,0 кг/т корма.

• индюки – 1,0-2,0 кг/т корма.

Период ожидания

Отсутствует.

Срок годности

24 месяцев со дня изготовления при соблюдении условий хранения.

Условия хранения

Хранят в закрытой упаковке производителя, защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от 5°С до 25°С.

Упаковка

Мешки по 20 и 25 кг.

Производитель

АПЕКС ПЛЮС, Россия.