



ЦЕФТИВЕТ®

Производитель: WORLD-VET
Цефтиофур 50 мг, суспензия для инъекций

Преимущества

- Широкий спектр действия.
- Быстрое терапевтическое действие за счет достижения максимальной концентрации через 1-2 часа.
- Отсутствие ограничений по молоку и короткий период ожидания по мясу (7 дней).
- Экономичность и удобство в применении — 1 инъекция за обработку.

Состав

В 1 мл суспензии содержится 50 мг цефтиофура в форме цефтиофура гидрохлорида и вспомогательные вещества: сорбитана моноолеат, пропиленгликоль дикаприлокапрат.

Биологические свойства

Цефтивет® – антибактериальный препарат группы цефалоспоринов широкого спектра действия, обладающий бактерицидным эффектом. Как и другие цефалоспорины, препарат оказывает бактерицидный эффект за счет подавления синтеза клеточной стенки микроорганизмов. Цефтиофура гидрохлорид эффективен в отношении *Escherichia coli*, *Citrobacter spp.*, *Klebsiella spp.*, *Pasteurella spp.*, *Proteus spp.*, *Salmonella spp.*, *Haemophilus somnus*, *Actinomyces pyogenes*, *Staphylococcus spp.*, *Streptococcus spp.*, *Bacillus spp.*, *Crynebacterium spp.*, *Clostridium spp.*, *Bacteroides spp.*, *Fusobacterium spp.*, *Actinobacillus spp.*, *Erysipelotrix rhusiopathiae*.

У животных максимальная концентрация в сыворотке крови достигается в течение 1,5-2 часов после внутримышечного применения. Особенно высокий уровень цефтиофура гидрохлорид наблюдается в бронхиальной слизи. Цефтивет® не всасывается после применения перорально. У свиней после внутримышечного введения максимальная концентрация в сыворотке крови достигается в течение 20-60 минут после введения.

Показания

Цефтивет® предназначен для лечения инфекций мягких тканей и дыхательных путей у крупного рогатого скота, лошадей, свиней, овец, коз, собак, цыплят и индюшат, вызванных чувствительными к цефтиофуру микроорганизмами. Препарат применяют для лечения бактериальных инфекций органов дыхания, вызываемых *Pasteurella haemolytica*, *Pasteurella multocida*, *Haemophilus somnus*, для терапии некробактериоза, ассоциированного с *Fusobacterium necrophorum* у крупного рогатого скота; для лечения острого эндометрита коров; для лечения инфекций органов дыхания, вызываемых *Pasteurella haemolytica*, *Pasteurella multocida*, *Actinobacillus pleuropneumoniae* и *Streptococcus suis* у свиней.

Рекомендации по применению

- КРС – 1 мл/50 кг массы тела. Частота применения: 1 раз в сутки внутримышечно. Продолжительность терапии составляет 3 дня, в случае неэффективности лечения препарат продолжают применять еще в течение 2 дней.
 - Свиньи – 1 мл на 16 кг массы животного (3 мг цефтиофура на кг живой массы) один раз в сутки внутримышечно в течение 3 дней.
 - Овцы и козы – 1 мл раствора на 50 кг массы тела (1 мг/кг массы тела по ДВ) внутримышечно в течение 3-5 дней.
 - Лошади – 2 мл раствора на 50 кг массы тела (2 мг/кг массы тела по ДВ) внутримышечно, но не более 10 мл в одно место, до выздоровления (не более 10 дней). В случае если препарат требуется вводить в больших объемах, общая доза делится из расчета 15 мл для каждого введения.
 - Цыплята – 0,1 мг/голову раствора (по ДВ) или 0,002 мл/голову однократно орально, для индюшат – однократно 0,2 мг/голову раствора (по ДВ) или 0,004 мл/голову орально. Препарат выпаивают птице групповым способом путем его разведения в 100 л питьевой воды на 10000 голов из расчета 1000 мг препарата (по ДВ) или 20 мл.
-

Противопоказания

Не применять при индивидуальной повышенной чувствительности животных к цефалоспориновым антибиотикам и пенициллинам, при нарушениях функции почек.

Период ожидания

Мясо – 7 суток. Молоко без ограничений.

Условия хранения

В сухом, защищенном от света месте при температуре от плюс 15°C до плюс 25°C.

Срок годности

2 года.

Упаковка

Флаконы из нейтрального стекла по 10, 20, 50, 100, 250, 500 и 1000 мл.

Производитель

WORLD-VET, Турция.
