



КОКЦИТОКС 2,5%

Производитель: Белека

Препарат эффективен против всех видов эймерий, паразитирующих у птицы.

Состав

В 1 мл препарата содержится 25 мг толтразурила, вспомогательные вещества (спирт бензиловый, полиэтиленгликоль-400, триэтаноламин) и растворитель (пропиленгликоль).

Биологические свойства

Толтразурил, входящий в состав препарата, — синтетический эймериостатик с высокой степенью безопасности, относящийся к группе триазинтриона.

Эффективен в отношении всех видов эймерий, паразитирующих у птиц (*Eimeria tenella*, *Eimeria necatrix*, *Eimeria brunetti*, *Eimeria acervulina*, *Eimeria maxima*, *Eimeria praecox*, *Eimeria hagani*, *Eimeria mivati*) и пушных зверей (*Eimeria vilson*, *Eimeria furonis*, *Isospora eversanii*, *Isospora laidlowi*), в том числе устойчивых к другим противоэймериозным средствам.

Препарат оказывает губительное действие на всех стадиях развития эймерий.

Механизм действия толтразурила заключается в нарушении процессов клеточного деления шизонтов и микрогамонтов, за счет ингибирования ряда ферментов, участвующих в синтезе пиримидина и клеточном дыхании.

Препарат не препятствует формированию иммунитета к эймериозу.

После перорального введения толтразурил медленно всасывается в желудочно-кишечном тракте и оказывает эймериоцидное действие в слизистой и подслизистой оболочках.

Максимальная концентрация в плазме крови достигается через 24 часа. Биодоступность составляет 70%.

Показания

Препарат применяют сельскохозяйственной птице (бройлерам, ремонтному молодняку кур, индеек, гусей, уток) и пушным зверям при эймериозе. Препарат назначают при достижении критического уровня содержания эймерий в подстилке (10-20 тыс./гр), а также при появлении клинических признаков заболевания.

Рекомендации по применению

Сельскохозяйственной птице препарат задают орально с питьевой водой через систему поения в дозе 1 литр на 1 тонну питьевой воды в течение 48 часов, что эквивалентно 28,0 мл препарата (0,7 г толтразурила) на 100 кг массы птицы, или в дозе 3 литра на 1 тонну питьевой воды, которую выпаивают птице по 8 часов два дня подряд.

В тяжелых случаях заболевания курс лечения повторяют через пять дней.

Период ожидания

Убой цыплят-бройлеров и молодняка кур на мясо разрешается не ранее, чем через 14 суток, а индеек и гусей через 16 суток после последнего применения препарата.

Условия хранения

Хранят в защищенном от света месте при температуре от плюс 2°C до плюс 25°C.

Срок годности

3 года.

Упаковка

Полимерные флаконы 20 мл и 1 л.

Производитель

Белека, Р. Беларусь.
