



ТИЛОЦИН 500 МЕ

Производитель: ЗападВетСервис

Состав

В 1,0 г препарата содержится не менее 500000 МЕ тилозина тартрата, вспомогательные вещества.

Биологические свойства

Порошок для орального применения. Действующее вещество – тилозина тартрат.

Показания

«Тилоцин 500 МЕ» применяют для лечения респираторного микоплазмоза у птицы, инфекционного синусита у индеек, дизентерии и гастроэнтероколитов бактериальной этиологии у свиней, бронхопневмонии у телят, вызванной микроорганизмами, чувствительными к тилозину.

Рекомендации по применению

- Телята индивидуально, внутрь с кормом или с водой из расчета 10-20 мг/кг массы животного 2 раза в сутки до выздоровления (5-10 дней).
- Свиньи – при дизентерии и гастроэнтероколитах бактериальной этиологии у свиней препарат назначают индивидуально или групповым способом в дозе 0,5-1,0 г на 1 л воды (10 мг/кг массы животного) в течение 3-5 дней.
- Птица – препарат добавляют в питьевую воду в дозе 1,0 г на 1 л воды в течение 3-5 дней в зависимости от тяжести заболевания.

Период ожидания

Убой свиней и птицы на мясо, а также использование яиц для пищевых целей, разрешается не ранее, чем через 8 суток после последнего применения препарата. Убой крупного рогатого скота разрешается через 14 суток после последнего назначения препарата.

Условия хранения

Хранят в сухом, защищенном от света месте при температуре от 0°C до плюс 25°C.

Производитель

ООО «ЗападВетСервис», Беларусь.
