



ЭНРОЦИН 20%

Производитель: ЗападВетСервис

Состав

Препарат содержит 20% энрофлоксацина, вспомогательные вещества, декстроза моногидрат.

Биологические свойства

Порошок для орального применения.

Показания

«Энроцин 20%» применяют при колибактериозе, сальмонеллезе, микоплазмозе, бронхопневмонии, энтеритах и других заболеваниях, вызванных микроорганизмами, чувствительными к энрофлоксацину, в том числе при атрофическом рините, энзоотической пневмонии и синдроме мастит-метрит-агалактия, а также при аэромонозе, псевдомонозе, цитробактериозе и др.

Рекомендации по применению

- Молодняк крупного рогатого скота, свиньи – один раз в сутки в смеси с кормом в течение 3-5 дней в дозе 12,5-25,0 мг препарата на 1 кг массы животного.
- Птице препарат применяют в смеси с комбикормом в дозе 0,5 кг Энроцина 20% на 1 тонну корма.
- Молодняку крупного рогатого скота, свиньям препарат применяют в смеси с комбикормом в дозе 0,375 кг Энроцина 20% на 1 тонну корма. При сальмонеллезе и в тяжелых случаях заболевания свиней дозу препарата увеличивают в два раза.
- Прудовая рыба – суточная доза препарата задается групповым способом с кормом из расчета 500 г препарата на 1

тонну комбикорма в течение 3-5 дней в зависимости от тяжести заболевания.

Препарат термостабилен. Корм с препаратом может подвергаться термической обработке и гранулированию.

Противопоказано совместное применение препарата с антибиотиками групп макролидов, тетрациклина, амфеникола, нестероидными противовоспалительными средствами, теофиллином. Не назначают препарат беременным и лактирующим животным, имеющим повышенную чувствительность к фторхинолонам.

Препарат запрещен к применению птице, чье яйцо используется в пищу людям.

Период ожидания

Убой животных на мясо разрешается не ранее, чем через 14 суток, а птицы через 12 суток после последнего применения препарата. Мясо животных и птицы, вынужденно убитых до истечения указанного срока, может быть использовано для кормления плотоядных животных. Реализация товарной рыбы разрешается через 15 дней после прекращения применения препарата.

Производитель

ООО «ЗападВетСервис», Беларусь.
