



САНИВИР® ПЛЮС S

Производитель: Bioplagen

Дезинфицирующее средство в виде шашки широкого спектра и усиленного действия против насекомых.

Преимущества

- Эффективная борьба в отношении всех вирусов, бактерий, грибов и насекомых.
- Равномерное распределение дыма с действующими веществами по всему помещению.
- Обеспечивает эффективную дезинфекцию даже в труднодоступных местах.
- Не коррозивен и не разъедает поверхности.
- Удобные упаковки на различную кубатуру обработок.
- Европейское качество.

Состав

2-фенилфенол – 6-9%, глутаровый альдегид – 3-5%, тетраметрин – 0,7-1% и вспомогательные компоненты до 100%.

Биологические свойства

САНИВИР ПЛЮС S позволяет проводить дезинфекцию в труднодоступных местах помещения, где обработка дезинфектантом в форме жидкого раствора или спрея затруднительна.

САНИВИР ПЛЮС S благодаря своей формуле, во время тления выделяет фенилфенол и глутаровый альдегид, которые медленно и равномерно распространяются по всему объему помещения.

САНИВИР ПЛЮС S обладает выраженным бактерицидным, фунгицидным и вирулицидным действием. Проявляет дезинфицирующую активность в отношении всех вирусов – оболочечных и безоболочечных, всех бактерии, грибов и спор.

САНИВИР ПЛЮС S оказывает действие при отрицательных температурах, не коррозивен и не разъедает поверхности.

САНИВИР ПЛЮС S является **отпалкивающим средством для насекомых:**

- Мухи: *Stomoxys calcitrans*, *Musca domestica*, *Cochliomyia hominivorax*, *Fannia canicularis*, *Psychoda* spp.
 - Комары: *Aedes aegypti*, *Aedes albopictus*, *Culex* spp.
 - Осы: *Vespa velutina*, *Vespula vulgaris*.
 - Жуки: *Alphitobius diaperinus*.
 - Блохи и вши: *Linognathus* spp., *Ctenocephalides* spp.
 - Клещи: *Ornithodoros* spp., *Ixodes* spp., *Dermanyssus gallinae*.
-

Показания

САНИВИР ПЛЮС S применяют для профилактической и вынужденной дезинфекции объектов ветеринарного надзора в отсутствии животных. Продукт не требует предварительной подготовки перед применением.

САНИВИР ПЛЮС S соответствует стандарту NF T 72-281 по бактерицидной, вирулицидной и фунгицидной активности.

Рекомендуется для обработки:

- животноводческих пустых помещений в конце цикла, вентиляционных систем и каналов;
 - для дезинфекции клеток, вспомогательного оборудования, складов;
 - для обработки кормовых бункеров, складов, элеваторов, зернохранилищ;
 - транспорта для перевозки животных (включая ж/д вагоны, грузовики, холодильные камеры, трюмы корабля) и других помещений /оборудования, нуждающиеся в надежной и эффективной дезинфекции.
-

Дозировка

САНИВИР ПЛЮС S применяют исходя из расчета 1 г продукта на 2 м³ обрабатываемого объема.

Рассчитайте количество банок, необходимых для обработки объема пространства в кубических метрах. Разместите банки равномерно по помещению. Подожгите фитиль у первой банки. Начинайте с самой дальней точки и двигайтесь в сторону выхода. Когда начнет появляться густой белый дым, переходите к следующей банке.

После поджога всех банок, покиньте помещение и закройте двери на время обработки. Рекомендуем использовать предупреждающие таблички с надписью «зона фумигации». Экспозиция – 24-48 часов. Проветрите продезинфицированное пространство перед повторным входом.

Срок годности

2 года со дня изготовления при соблюдении условий хранения.

Условия хранения

Хранят в закрытой упаковке производителя, в хорошо вентилируемом, сухом и прохладном помещении, защищенном от прямых солнечных лучей месте, при температуре от 5°C до 25°C.

Упаковка

металлические банки по 15, 25, 200 г. и 1 кг.

Производитель

BIOPLAGEN, S.L., Испания.
