провет

Москва, ул. Ленинская Слобода 19, БЦ "Омега Плаза"
+7 (495) 106-47-03
info@provet.ru

САНИВИР®

Производитель: Bioplagen
Концентрированное дезинфицирующее средство широкого спектра действия.

Преимущества

- Концентрированное, многофункциональное и экономичное дезинфицирующее средство.
- Обладает выраженным бактерицидным, фунгицидным, вирулицидным и спороцидным действием.
- Обладает высокой поверхностно-активной способностью, что делает средство более эффективным в сложных условиях при наличии органических загрязнений и пористых поверхностей.
- Европейское качество.

Состав

Глутаровый альдегид – 15%, дидецилдиметиламмония хлорид – 10%, вспомогательные компоненты и вода до 100%.

Биологические свойства

САНИВИР® проявляет дезинфицирующую активность в отношении всех вирусов – оболочечных и безоболочечных, в том числе возбудителей:

• *Adenoviridae* – синдрома снижения яйценоскости;
• *Adenoviridae* – геморрагического энтерита птиц;
• *Birnaviridae* – болезни Гамборо;
• *Circoviridae* – инфекционной анемии;
• *Coronaviridae* – инфекционного бронхита;
• *Herpesviridae* – болезни Марека;
• *Herpesviridae* – инфекционного ларинготрахеита;
• *Orthomyxoviridae* – птичьего гриппа;
• *Paramyxoviridae* – болезни Ньюкасла;
• *Poxviridae* и др. – оспы птиц.

Проявляет дезинфицирующую активность в отношении всех бактерии, в том числе возбудителей:

• *Campylobacter spp.* – кампилобактериоза;

• *Escherichia coli* – колибактериоза;

• *Avibacterium paragallinarum* – инфекционного ринита;

• *Listeria monocytogenes* – листериоза;

• *Mycoplasma gallisepticum* – микоплазмоза;

• *Mycoplasma synoviae* – инфекционного синовита;

• *Pasteurella multocida* – пастереллеза;

• *Salmonella spp.* – сальмонеллеза;

• *Salmonella Typhi.* – брюшного тифа;

• *Staphylococcus spp.* – стафилококковой инфекции;

• *Streptococcus spp.* и др. – стрептококковой инфекции.

Проявляет дезинфицирующую активность в отношении грибов и спор, в том числе:

• *Aspergillus spp.* – аспергиллез;

• *Candida albicans* и др. – кандидоз.

Показания

САНИВИР® применяют для профилактической и вынужденной дезинфекции объектов ветеринарного надзора:

• Помещений для содержания животных (коровников, родильных отделений, телятников) и находящегося в них технологического оборудования (в том числе поилки, ведра, ящики).

• Вспомогательных объектов животноводческих предприятиях, кормоцехов, боен, убойных цехов, цехов переработки животноводческих продукции, мясокомбинатов, вскрывочных, лабораторий.

• Промышленного оборудования и сооружений, клеток и транспортной тары, поддонов, стеллажей, тележек, инвентаря по уходу за животными.

• Ветеринарных инструментов.

• Систем поения и баков.

• Поверхностей, не контактирующих с пищевыми продуктами.

• Любых транспортных средств, в том числе используемых для перевозки животных, а также сырья животного происхождения.

• Поверхностей из хромированной и нержавеющей стали, меди, латуни, стекла, крашенного и некрашеного бетона, некрашеного и крашенного дерева, пластика, глазурованной и неглазурованной плитки, пластмассы, латекса, резины.

Средство термостабильно и может использоваться методом горячего тумана для заключительной дезинфекции. Дезинфектант может наноситься с помощью аппаратов высокого и низкого давления, пеногенераторов, аэрозольных генераторов любой конструкции.

Дозировка

1. Удалить все переносное оборудование, мусор, навоз, подстилку, очистить животноводческое помещение.

2. Обработать поверхности с помощью моющего средства при давлении 45-70 бар. Для обработки можно использовать высокоэффективный детергент КЛИНГАРД HS-30 (производства Bioplagen SL.). Оставить пену на поверхностях на 15 минут, смыть пену водой под оптимальным давлением 45 бар, удалив загрязнения вместе с пеной.

3. Перейти к дезинфекции – приготовить рабочий раствор дезинфицирующего средства САНИВИР® путем добавления соответствующего количества средства к водопроводной воде.
Разведение зависит от цели и метода использования средства:
• плановая или общая влажная дезинфекция при использовании детергента – 0,3%;
• плановая или общая влажная дезинфекция без использовании детергента – 0,5%;
• вынужденная дезинфекция после вспышки инфекции – 1%;
• обработка туманом холодным/горячим – 10%. При расчете концентрации рабочих растворов средство принимают за 100% вещество. Приготовленный рабочий раствор можно использовать в течение 24 часов.
Рабочий раствор САНИВИР® наносят на обрабатываемые поверхности, начиная с крыши и двигаясь к полу.
Дезинфекцию проводят методом орошения, аэрозольного распыления, пены или разбрызгивания.

Норма расхода: 1 л рабочего раствора предназначен для обработки 10-20 м^2 (спрей), 500 м^3 (холодный туман) или 1000 м^3 (горячий туман).
Время экспозиции – от 30 минут до 1 часа, вне зависимости от выбранного разведения. Не требует смывания.
Не коррозивен, легко поддается биоразложению, и при должном обращении не оказывает влияния на окружающую среду.

4. **Дать высохнуть** помещению в течение 12 часов (до 48 часов), после чего помещение безопасно для животных.
Для определения активности действующего вещества доступен экспресс-тест от производителя Bioplagen SL.

Дезинфекция оборудования, кормушек, инструментов и др.: тщательно очистить оборудование, кормушки и др. с использованием детергента КЛИНГАРД HS-30 (производства Bioplagen SL.).
Оборудование дезинфицируют замачиванием в растворе САНИВИР® в разведении 1%, экспозиция 30 минут.
Ополаскивание не требуется, после полного высыхания в чистом месте оборудование, кормушки, ветеринарные инструменты могут быть использованы повторно.

Дезинфекция систем поения, резервуаров и баков для воды: слить воду из системы, очистить баки/резервуар(ы), заполнить чистой водой, добавив дезинфицирующее средство – САНИВИР® в разведении 1-3% и оставить на 10 минут, прежде чем активировать ниппели. Экспозиция 3-4 часа. Затем освободить системы от дезинфицирующего средства и снова наполнить систему чистой водой.

Дезинфицирующие барьеры, ванны для обработки обуви, колес и колесных арок автотранспорта, дезковрики и др.: использовать САНИВИР® в разведении 1,00%. Обувь и колеса транспортных средств предварительно следует очистить от видимых загрязнений. Обновление раствора проводят 1 раз в неделю, при сильной загрязненности раствора или при дождливой погоде, рекомендуется менять раствор чаще – 1 раз в 3 дня.
Возможно определение активности действующего вещества с помощью экспресс-теста от производителя Bioplagen

SL.

Дезинфекция методом аэрозольного распыления: распылять раствор с помощью генератора тумана в разведении 10%, расход 1 л рабочего раствора на 500 $м^3$ (холодный туман) или 1000 $м^3$ (горячий туман).

Срок годности

3 года со дня изготовления при соблюдении условий хранения.

Условия хранения

Хранят в закрытой упаковке производителя, в хорошо вентилируемом, сухом и прохладном помещении, защищенном от прямых солнечных лучей месте, при температуре от 5°C до 35°C.

Упаковка

Пластиковые канистры по 5 и 20 л.

Производитель

BIOPLAGEN, S.L., Испания.