Москва, ул. Ленинская Слобода 19, БЦ "Омега Плаза"
+7 (495) 106-47-03
info@provet.ru

ОРТОПАРАМИКСОВАК G7

Производитель: Evolink
Вакцина против Ньюкаслской болезни (штамм «GVII») и низкопатогенного гриппа птиц (H9N2) инактивированная эмульсионная.

Состав

Вакцина изготовлена из экстраэмбриональной жидкости эмбрионов кур, инфицированных вирусом Ньюкаслской болезни (штамм «GVII») и низкопатогенного гриппа птиц (штамм H9N2), инактивированного формальдегидом с добавлением масляного адъюванта Montanide ISA 70 в соотношении 30:70.

По внешнему виду вакцина представляет собой однородную эмульсию от белого до бело-розового цвета. При хранении вакцины допускается незначительное расслоение эмульсии, с просветлением на верхней части флакона, без отделения водной фазы. Однородность эмульсии восстанавливается при тщательном взбалтывании.

Биологические свойства

Вакцина вызывает формирование иммунного ответа у кур к возбудителям Ньюкаслской болезни и низкопатогенного гриппа птиц (H9N2), через 28 суток после второй вакцинации, продолжительностью не менее 9 месяцев.

Показания

Вакцина предназначена для профилактики Ньюкаслской болезни и низкопатогенного гриппа птиц (H9N2) в птицеводческих хозяйствах различного направления выращивания, а также для вынужденной вакцинации в неблагополучных и угрожаемых хозяйствах с целью купирования инфекций не менее чем за месяц до начала яйцекладки проводят ревакцинацию.

Рекомендации по применению

Вакцину вводят подкожно в среднею треть шеи или внутримышечно в область большой грудной мышцы с соблюдением правил асептики двукратно с интервалом 21-28 дней. Объем прививной дозы для молодняка кур в возрасте 1-10 суток составляет 0,20 см3; для птицы старше 11-дневного возраста 0,5 см3. Перед применением флаконы с вакциной выдерживают в течение 3-4 часов при температуре 18-20 °С.

Через 28 суток после второй вакцинации проводят контроль напряженности иммунитета, исследуя не менее 25 проб сывороток крови птиц от птичника или населенного пункта в реакции торможения гемагглютинации (РТГА). Вакцинацию считают успешной, если не менее чем у 80 % привитых птиц титр антител вирусам НБ и ГП Н9 составляет не ниже 4 log2 (1:16).

Период ожидания

Убой птицы на мясо рекомендуется проводить не ранее чем через 30 суток после введения вакцины. Яйцо, полученное от вакцинированной птицы, используют без ограничений.

Условия хранения

Вакцину хранят и транспортируют в защищенном от света месте и местах, недоступных для детей, при температуре от 2°С до 8°С. Замораживание вакцины не допускается.

Срок годности

18 месяцев.

Упаковка

Вакцина расфасована по 10 см3 (20 доз для кур, 50 доз для цыплят), по 20 см3 (40 доз для кур, 100 доз для цыплят), 100 см3 (200 доз для кур, 500 доз для цыплят), 500 см3 (1000 доз для кур, 2500 доз для цыплят) в стеклянные и/или полимерные флаконы соответствующей вместимости, герметично укупоренные резиновыми пробками, укрепленными алюминиевыми колпачками.

Производитель

Evolink, Россия.