



ЮБЕРИН ОРАЛЬНЫЙ

Производитель: Белека

Ветеринарный препарат для профилактики и лечения нарушений обмена веществ различной этиологии.

Состав

В 1 мл препарата содержится: 200 мг бутафосфана, 0,15 мг цианокобаламина, 10 мг таурина, вспомогательные вещества и растворитель.

Биологические свойства

Входящие в состав препарата вещества оказывают тонизирующее действие на организм, нормализуют метаболические и регенеративные процессы, оказывают стимулирующее влияние на белковый, углеводный и жировой обмены веществ, повышают резистентность организма к неблагоприятным факторам внешней среды, способствуют росту и развитию животных и птицы.

Бутафосфан – органическое соединение фосфора, оказывающее влияние на многие ассимиляционные процессы в организме. Бутафосфан улучшает утилизацию глюкозы в крови, что способствует стимуляции энергетического обмена; ускоряет процессы метаболизма за счет стимуляции АДФ - АТФ цикла; активизирует все функции печени; повышает неспецифическую резистентность организма; стимулирует гладкую мускулатуру и повышает ее двигательную активность; восстанавливает работу миокарда; стимулирует образование костной ткани; нормализует уровень кортизола в крови; стимулирует синтез протеина, ускоряя рост и развитие животного, а также репаративные свойства органов и тканей.

Цианокобаламин (витамин B12) стимулирует кроветворение, участвует в формировании креатина (источника энергии мышечной ткани), принимает участие в биосинтезе ацетилхолина, оказывающего влияние на состояние нервной системы, стимулирует жировой обмен и обмен карбоновых кислот – нормализует процесс усвоения пищи, способствует биосинтезу метионина.

Таурин – серосодержащая аминокислота. При системном воздействии таурин оказывает метаболическое действие, обладает гепатопротекторным, кардиотоническим и гипотензивными свойствами. В головном мозге таурин играет роль нейромедиатора (передатчик нервных импульсов), улучшает энергетические и репаративные процессы.

Являясь сульфаминоокислотой, таурин восстанавливает функции клеточных мембран и улучшает процессы обмена в организме.

Показания

Препарат применяют молодняку крупного и мелкого рогатого скота, жеребят, поросятам, сельскохозяйственной птице для профилактики и лечения нарушений обмена веществ различной этиологии, а также в качестве стимулирующего, тонизирующего средства (при послеродовых парезах, параличах, гипотрофии, в период реконвалесценции), и для повышения неспецифической резистентности, сопротивляемости организма к неблагоприятным факторам внешней среды и стрессам.

Рекомендации по применению

- Куры-несушки, бройлеры: 1-1,5 мл/л;
 - Цыплята, ремонтный молодняк: 0,5-1 мл/л;
 - Цыплята-бройлеры (снятие теплового удара): 10 мл/л;
 - Телята, жеребята: 10-12 мл/жив.;
 - Овцы, козы: 5-8 мл/жив.;
 - Ягнята, козлята: 2-3 мл/жив.;
 - Поросята: 1-2 мл/жив.;
 - Поросята (групповой): 0,5-15 мл/л.
-

Период ожидания

Отсутствует.

Условия хранения

Препарат хранят в упаковке предприятия-изготовителя по списку Б, в сухом, защищенном от света месте при температуре от плюс 5°C до плюс 25°C.

Срок годности

2 года от даты изготовления при соблюдении условий хранения. После вскрытия флакона – 30 суток при указанных условиях хранения.

Упаковка

Полимерные флаконы 1 литр.

Производитель

Белека, Р. Беларусь.
