



# ЭНДУРО

Производитель: Ветфармстандарт  
Антибактериальный препарат на основе энрамицина.

## Преимущества

- Не требует ежеквартальной ротации.
- Отсутствие остатков препарата в мясе без предубойного голодания.
- Одна из лучших в классе эффективность против всех видов клостридий, MRSA и E.coli.
- Простой и понятный режим дозирования, ввиду стабильно высокого качества препарата.
- Полностью позволяет раскрыть генетический потенциал птицы.

## Состав

В качестве действующего вещества содержит высушенную ферментационную массу энрамицина с активностью энрамицина моногидрата, а также вспомогательный компонент — порошок из рисовых отрубей.

## Биологические свойства

Механизм действия энрампицина заключается в ингибировании этапа трансгликозилирования в процессе биосинтеза пептидогликана у грамположительных бактерий.

Энрамицин обладает антибактериальным эффектом в отношении большинства грамположительных бактерий, включая *Staphylococcus* spp., *Streptococcus* spp., *Diplococcus* spp., *Listeria* spp., *Corynebacterium* spp., а также *Clostridium perfringens* и *Clostridium difficile*, вызывающих некротический энтерит у животных.

Большая молярная масса молекулы энрамицина – 2355,30 г/моль препятствует её прохождению сквозь стенку кишечника и проникновению в кровяное русло. Препарат почти не всасывается и в неизменном виде выводится из кишечника. Сохраняет стабильность в корме в процессе гранулирования.

## Показания

Лечение и профилактика некротического энтерита, синдрома мальабсорбции, пододерматитов, энтероколитов и дисбиозов вызванных неконтролируемым ростом патогенной микрофлоры кишечника, как в результате контаминации кормов патогенной микрофлорой, так и при потреблении кормов с повышенным содержанием клетчатки.

---

## Рекомендации по применению

Для лечения некротического энтерита и синдрома мальабсорбции Эндуро применяют в дозах:

- бройлерам (рационы-предстартер; стартер, гроуэр, 1-й финишер) — 200-280 г препарата/тонну корма;
- бройлерам (рацион - 2-й финишер с учетом предубойного голодания птицы в течении 6 часов с целью высвобождения органов пищеварения от содержимого) — 150 г препарата/тонну корма;
- несушкам (до 16 недель) - 200 г препарата/тонну корма;
- несушкам (старше 16 недель) - 90 г препарата/тонну корма;
- индейкам (рационы - предстартер; стартер; гроуэр; 1-й финишер) — 200-280г препарата/тонну корма.

Для контрольного лечения синдрома мальабсорбции у птиц, а также для контрольного лечения при пододерматитах, энтероколитах и дисбиозах вызванных неконтролируемым ростом патогенной микрофлоры кишечника как в результате контаминации кормов патогенной микрофлорой, так и при потреблении кормов с повышенным (более чем 4 %) содержанием своём составе клетчатки и прочих антипитательных факторов Эндуро применяют в дозах:

- бройлерам (рационы - предстартер; стартер, гроуэр, 1-й финишер) — 150 г препарата/тонну корма; - бройлерам (рацион 2-й финишер с учетом предубойного голодания птицы в течении 6 часов с целью высвобождения органов пищеварения от содержимого) — 150 г препарата/тонну корма;
  - несушкам (до 16 недель) - 150 г препарата/тонну корма;
  - несушкам (старше 16 недель) - 90 г препарата/тонну корма;
  - индейкам (рационы - предстатер; стартер; гроуэр; 1-й финишер) — 150 г препарата/тонну корма.
- 

## Особенности применения

Эндуро применяется только в составе комбикормов. Комбикорма с введенным Эндуро не должны подвергаться температурному воздействию выше 100 °С.

Возможно одновременное применение Эндуро с другими лекарственными препаратами и кормовыми добавками, используемыми в комбикормах (за исключением акромицина, китасамицина и виржиниамицина).

Следует избегать пропусков при введении очередной дозы препарата так как это может привести к снижению терапевтической эффективности. В случае пропуска одной дозы необходимо возобновить применение препарата в той же дозе и по той же схеме.

---

## Производитель

ООО "ВЕТФАРМСТАНДАРТ", Россия.

---