



ЦИНКАБ

Производитель: Impextraco
Цинк оксида с высокой биодоступностью против диарей.

Преимущества

- Более высокая биодоступность и антимикробная эффективность.
- Норма ввода ниже в 6 раз.
- Не снижает потребление корма.
- Не содержит тяжелые металлы.
- Более эффективная борьба с тяжелыми диареями на отъеме.
- Получение результатов по более высокой массе тела поросят.
- Обеспечивает потребность организма птицы в биодоступном цинке.
- Укрепляет прочность скелета и качество оперения птицы.

Состав

ЦИНКАБ® (Zincab) содержит в своем составе оксид цинка – 100%. По внешнему виду ЦИНКАБ® представляет собой белый сыпучий микрогранулят с легким химическим запахом.

Биологические свойства

ЦИНКАБ® – оксид цинка с повышенной био- и антимикробной эффективностью благодаря специально разработанному методу производства. Антибактериальное действие ZnO определяется площадью поверхности частиц в 1 г. Активная площадь поверхности ЦИНКАБ® в 67 раз выше площади обычного ZnO.

Поэтому 500 г ЦИНКАБ® по антимикробной и био-активности соответствует 3000 г оксида цинка.

ЦИНКАБ® по сравнению с кормовым оксидом цинка имеет в 6 раз меньшую буферную емкость и, соответственно, в 6 раз меньше нейтрализует HCL в желудке поросят и отрицательно влияет на переваривание белка; в 6 раз меньше

отрицательно взаимодействует с фитазой и с минералами; в 6 раз меньше токсичность Zn и ниже загрязнение тяжелыми металлами, выше экологичность.

Низкая норма ввода обеспечивает больше места в премиксе!

Показания

Лечение и профилактика диарей у поросят в период отъема.

В птицеводстве ЦИНКАБ® назначают для обеспечения потребности организма птицы в биодоступном цинке, поддержке работы иммунной системы, укрепления прочности скелета, качества оперения. В качестве антимикробного препарата для оказания действия в кишечнике (особенно в стартере) и борьбе с бактериальными диареями. Ввод ЦИНКАБ® позволяет снизить уровень вводимого в рацион цинка при сохранении его эффективности.

Рекомендации по применению

ЦИНКАБ® применяют в дозировке 500 г/т корма для профилактики постотъёмных ЕТЕС диарей поросят в первые 2-3 недели после отъема, повышения продуктивности и как источник Zn.

Для профилактики ЕТЕС диарей, отечной болезни, дизентерии и илеита ЦИНКАБ® вводят в корм в дозе 800-1500 г/т корма.

Бройлеры для профилактики диарей, повышения продуктивности и как источник Zn:

- Старт: 110-120 г/т корма;
 - Рост: 90-110 г/т корма;
 - Финиш: 70-90 г/т корма.
-

Период ожидания

Отсутствует.

Срок годности

2 года.

Условия хранения

Хранят в закрытой упаковке организации-производителя, в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от минус 30°C до плюс 35°C.

Упаковка

Выпускают ЦИНКАБ® расфасованным в крафтовые многослойные мешки по 25 кг. Каждую единицу фасовки маркируют с указанием: организации-производителя, ее адреса, названия, содержания действующих веществ, объема средства в упаковке, даты изготовления, срока годности, номера серии, условий хранения, мер предосторожности.

Производитель

IMPEXTRACO N.V., Бельгия.
